

اهمیت بررسی های کروموزومی در سلول درمانی و کاربردهای آن

تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۳/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۹۹/۶/۱۶

فاطمه منصوری^{۱*}، علی گلچین^۲

^۱ گروه ژنتیک و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۲ مرکز تحقیقات سلوی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران

^۳ گروه علم سلوی کاربردی و بیوشمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در حال حاضر کاربردهای سلول درمانی یک روش درمانی موثر در برخی از انواع بیماری‌هاست. استفاده از سلول‌های بنیادی و سلول‌های سوماتیک با توجه به تشابه ژنتیکی کامل با سلول‌های فرد سبب توسعه روش‌های سلول درمانی شده است. در سالیان اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در روش‌های کشت، جدا سازی و نگهداری طولانی مدت سلول‌ها فراهم شده است. اما هنوز مشکلات و نگرانی‌هایی در ارتباط با استفاده بالینی از آنها وجود دارد که برطرف کردن آنها مستلزم اجرای مطالعات دقیق بیشتری در این زمینه است. یکی از این مشکلات، تغییرات ژنومی در سلول‌های است که می‌توانند بر پتانسیل تمایز سلول‌های بنیادی تأثیر گذارند. ناهنجاری‌های ژنتیکی در طول کشت‌های متوالی در حین مراحل تکثیر و تمایز بوجود می‌آیند، می‌توانند بر رفتار سلول‌ها و متعاقب آن بر نتایج آزمایشگاهی تأثیر بگذارند. هدف از مطالعه حاضر اهمیت بررسی‌های کروموزومی در سلول درمانی برای تجزیه و تحلیل کروموزوم‌ها و خلاصه‌ای از کاربردها و محدودیت این روش‌ها در علوم پزشکی می‌باشد.

نتیجه گیری: استفاده از تکنیک‌های مختلف بررسی‌های کروموزومی می‌توانند در ارزیابی نهایی و اخذ تاییدیه صحت محصولات سلوی در درمان مورد توجه قرار گیرند. و بررسی‌های دوره‌ای و منظم از پایداری ژنومی در سلول‌ها قبل از کاربردهای کلینیکی آنها ضروری است.

کلمات کلیدی: سلول‌های بنیادی، کروموزوم، سلول درمانی، ناهنجاری‌های ژنتیکی

نویسنده مسئول:

گروه ژنتیک و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

۰۹۱۲۳۷۰۴۱۵۳

Email: mansouri1600@hotmail.com

مقدمه

گیرند.^۷ Wang و همکاران کاهش طول تلومر و فعالیت آنزیم تلومراز را در سلولهای بنیادی جینی در چند کلون در طی پاساژهای متواالی و همچنین تریزومی کروموزوم شماره ۱۰ را در یک کلون در پاساژهای بالا مشاهده کردند.^۸ هدف از مطالعه حاضر اهمیت بررسی های کروموزومی در سلول درمانی برای تجزیه و تحلیل کروموزوم ها و خلاصه ای از کاربردها و محدودیت این روشهای در علوم پزشکی می باشد که با پیشرفت علم در زمینه سلول درمانی و استفاده از رهیافت های آن در تشخیص و درمان بیماری ها اهمیت شایانی پیدا کرده است.

لزوم بررسی های کروموزومی در سلول درمانی

ناهنجاری های ژنتیکی که در طول کشت های متواالی سلول در حین مراحل تکثیر و تمايز بوجود می آیند، می توانند بر رفتار سلول ها و متعاقب آن بر نتایج آزمایشگاهی تاثیر بگذارند.^{۹,۱۰} برخی از انواع سلولهای با تغییرات ژنتیکی رایج، علائم سرتانی شدن همچون کاهش آپوپتوز، عدم واپستگی به فاکتور رشد و راندمان بالای کلونیزاسیون را نشان می دهند.^{۱۱} نتایج مطالعه ای دیگر نشان دهنده حفظ پایداری کروموزومی سلولهای بنیادی مزانشیمی تا پاساژ دوم این سلول های طی فرایند کشت می باشد. از کشت دوم، به مرور علائم ناپایداری کروموزومی مانند شکاف های کروماتیدی و کروموزومی و تترابلوئیدی مشاهده می شود و کشت طولانی مدت این سلول ها می تواند یک مرحله میانی برای تومورزایی باشد.^{۱۲} روشهای مختلفی برای ارزیابی تغییرات ژنتیکی در سلولهای بنیادی مورد توجه بوده است. در این زمینه محققان بیشتر تمايل دارند در مطالعات سلولهای بنیادی و اطمینان از صحت آنها در زمینه درمانی و پزشکی باز ساختی از بررسی های کروموزومی استفاده نمایند (شکل ۱). تغییرات ژنتیکی در سلولهای بنیادی جینی انسان طی شرایط کشت سلولی متواالی می تواند نتایج ارزیابی ها را مخدوش کرده و به طور بالقوه نتیجه کاربردهای بالینی را با خطر مواجه سازد.^{۱۳} Baker و همکاران تعدادی از موزائیسم های کروموزومی را در سلولهای بنیادی انسانی مشاهده کردند.^{۱۴} از جمله تغییرات، اختلالات کروموزومی است که در سلول های بنیادی پرتوان انسانی و با استفاده از روش های

در حال حاضر کاربردهای سلول درمانی در بسیاری از بیماری ها دارای اهمیت است و یک روش درمانی موثر در برخی از سالم امیدهای زیادی در هر دو زمینه سلول درمانی و سلولهای سوماتیک شخصی فراهم آورده است.^{۱۵} از طرفی بانک و ذخیره سازی سلولهای بنیادی بدنانف جنین امکان اهدای آن را به خویشاوندان نزدیک فراهم نموده و فرصت بیشتری در اهدای سلول بوجود آورده است. سلول های بنیادی دارای پتانسیل چند گانه ای هستند که از یک طرف به عنوان سلول های حامی در ترشح سیتوکین ها و نقش تعدیلی در سیستم ایمنی و از طرف دیگر در تمایز سلول های بنیادی به سلول های تمایز یافته در بافت هدف در مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی حائز اهمیت هستند.^{۱۶} امروزه در درمان بیماری های قلبی - عروقی، پارکینسون، دیابت، سرطانها و حتی اخیرا در درمان مبتلایان به کرونا ویروس شایع در چندین کشور مورد استفاده قرار گرفته اند.^{۱۷} از این رو نگهداری طولانی مدت از سلولها و ذخیره آنها در بانک های سلولی مجهر به عنوان یک منبع اساسی و در دسترس، همراه با گواهی های معتبر شناسایی اختصاصی سلول در هر کشور مورد توجه محققین است. فرایند ذخیره سازی، احیا و کشت های متواالی سلول در ارتباط با استفاده بالینی، مشکلات و نگرانی هایی را بوجود آورده که برطرف کردن آنها مستلزم اجرای مطالعه های دقیق بیشتری در این زمینه است. یکی از این مشکلات، انواع تغییرات ژنومی در سلولهای است که می تواند بر پتانسیل تمایز سلول های بنیادی تأثیر بگذارد.^{۱۸} هر گونه استفاده از سلولها در پزشکی به علت حساسیت موضوع نیازمند تاییدیه سلامت محصول از جهت محتوای ژنومی می باشد.^{۱۹} با اینحال ارزیابی مزايا و معایب استفاده از انواع سلول های بنیادی و سلولهای سوماتیک باید در مرحله ای قبل از کاربرد بالینی انجام شود و کنترل ایمنی سلول درمانی، نه تنها مشروط بر توصیف بررسیهای کروموزومی سلول، بلکه نیازمند برآورد پایداری ژنتیکی و کلون زایی سلول است و استفاده از تکنیک های مختلف می تواند جهت این ارزیابی و اخذ تاییدیه محصول سلولی مورد توجه قرار

های کروموزومی در سلول های بنیادی مزانشیمی در پاساژهای او لیه نیز وجود دارد و می تواند به صورت کلونی تکثیر یابد و اغلب ناپایداری کروموزومی در این سلول ها را گزارش کرده اند^{۱۸}. برای مثال در مطالعه ای که اخیراً گزارش شده است سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از لته طی ارزیابی G-banding^{۱۲} تا پاساژ ۱۲ فاقد هرگونه ناهنجاری کروموزومی بوده است ولی به مرور تترالوئیدی خصوصاً در کروموزوم شماره ۸ مشاهده شده است^{۱۹}. Chen و همکاران تریزوومی کروموزوم شماره دو را در مایع آمنیوستیز با کمک روش Fluorescence in situ hybridization (FISH) گزارش کردند^{۲۰}. با اینحال ارزیابی مزايا و معایب استفاده از سلول های بنیادی باید در مرحله ای قبل از کاربرد بالینی انجام شود و کنترل اینمی سلول درمانی با استفاده از تکنیکهای مختلف می توانند جهت این ارزیابی و اخذ تاییدیه محصول سلولی مورد توجه قرار گیرند. این شاخه از علم که در تعامل با سلول ها و با اتکا بر تکنیک های نوین کروموزومی پیش می رود با شناسایی جهش های جایه جایی، معکوس شدگی، اضافه شدگی و حذف شدگی در ساختار محتواي ژنتیکی سلول های بدن و همچنین ناهنجاری های تعدادی کروموزوم ها (انیوپلوبیلیدی و یوپلوبیلیدی) در تشخیص بیماری هایی همچون سندرم داون، سندرم ادوارد (تریزوومی ۱۸)، سندرم پاتو (تریزوومی ۱۳) و سندرم های اختلالات کروموزوم های جنسی مانند سندرم های کلاین فلتر و ژاکوب نقش دارند^{۲۱}.

روشهای بررسی و آماده سازی کروموزوم ها

کروموزوم ها حاوی اطلاعات ژنتیکی مهمی هستند که طی فشرده شدن کروماتین ها در تقسیم میتوز قابل رویت می شوند و بررسی آنها اطلاعات مفیدی در خصوص ساختار آنها و اختلالات احتمالی مربوطه را ارائه می دهد. به تصویر کشیدن کروموزوم های سلول های سوماتیک انسانی نیازمند توقف تقسیم سلول ها در میتوز است. بعضی از سلول ها بصورت اتفاقی ممکن است در مرحله متافاز یا آنافاز در زمان آماده کردن سلول ها برای مطالعه در زیر میکروسکوپ تصویر برداری شوند. با این حال تعداد زیادی از سلول های در مرحله متافاز را می توان از طریق تحریک سلول ها

مختلف، تریزوومی در کروموزوم های شماره ۱، ۱۲، ۱۷ و ۲۰ گزارش شده است^{۱۴، ۱۱}.

ایشان ترکیبی از تکنیک های مختلف شامل banding, qPCR^{۱۴} و digital droplet fluorescence in situ hybridization^{۱۱} برای بررسی موزائیسم های سلولی استفاده کردند. از این رو بهتر است این رده های سلولی از جهت ناهنجاری کروموزومی به طور مرتب مورد بررسی قرار گیرند. اگرچه روش های دیگری نیز برای ارزیابی ژنوتیپ های سلول های بنیادی جنینی مورد استفاده قرار گرفته است تا کاربردهای اینم این سلول ها در پیشکی بازساختی را تضمین نماید^{۱۵}. روش رنگ آمیزی کروموزومی بصورت مرسوم جهت این ارزیابی استفاده می شود^{۱۶}. طی یک مطالعه بر روی سلول های بنیادی جنینی مشاهده شد که رنگ آمیزی DAPI (رنگ آمیزی رایج در مطالعات سلول های بنیادی) تقریباً با الگوی (باند G-band قرابت دارد و باند های C و G با شدت بیشتری توسط DAPI نسبت به گروه های R-banding) می شوند^{۱۶}. هتروکروماتین سازنده در اطراف سانتروم های کروموزوم های آکروستریک با DAPI بسیار لکه دار دیده می شوند. با اینحال از تکنیک بندینگ کروموزومی از جنبه های مختلف برای ارزیابی سلول های بنیادی جنینی استفاده می شود^{۱۶}.

ناپایداری های کروموزومی شایع در سلولهای بنیادی

چندین مطالعه تعدادی از ناهنجاری های کروموزومی را در بین نمونه های اهدای و طی کشت سلولی گزارش کرده اند^{۱۷، ۱۰}. میزان کمی انحراف کروموزومی غیر کلونال در سلول های بنیادی مزانشیمی مورد استفاده در کارآزمایی های بالینی مشاهده شده ولی گزارشی مبنی بر بدینخیمی آنها گزارش نشده است^{۱۸}. با این حال موضوع پایداری کروموزومی در سلول های بنیادی مزانشیمی قابل بحث هست و به این منظور طی چندین مطالعه ناهنجاری های کروموزومی کلونال در سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از G_banding^{۱۸، ۱۲} مورد بررسی قرار گرفته است. طی مطالعه ای که با استفاده از روش G-banding و کاریوتایپینگ درجا انجام شد، در کشت سلول پس از پنج پاساژ مکرر تغییرات کروموزومی با هیچ یک از دو روش مذکور مشاهده نشد^{۱۹، ۱۱}. هرچند که ناهنجاری

سیترات به مدت ۱۰ تا ۳۰ دقیقه بطور معمول به گسترش خوب کروموزومی منجر می شود. بکارگیری ناکافی محلول های هیپوتونیک به گستردگی نامطلوب کروموزومی منجر می شود و استفاده بیش از حد محلول های هیپوتونیک منجر به از دست رفتن کروموزوم ها و غیر قابل رویت شدن آنها می شود. محلول کارنوی (Carnoy's solution) که محلولی از اتانول و اسید استیک گلاسیال است به عنوان ثبت کننده سلول ها اضافه می شود.^{۲۲} تقریباً تمام روش های بررسی کروموزوم ها بر مبنای هاروست کروموزوم ها در میتوز است. این روش سبب مهار توبولین ها با استفاده از کلشیسین (Colchicine) یا کلسیمید (Colcemid) که سبب دپلایریزاسیون رشته های توبولین می شود انجام می پذیرد. برخی از انواع سلولها، به ویژه سلول های موش، در نهایت از بلوك کلسیمید فرار و وارد چرخه سلولی می شوند. انکوباسیون سلول ها در مدت طولانی با کلسیمید سبب می شود که باندهای ضعیف تری مشاهده شود. کروموزوم بندینگ بر مبنای رنگ آمیزی کروموزوم با یک رنگ و یا بررسی یک عملکرد ویژه در کروموزومهاست. طیف وسیعی از رنگها جهت مشاهده کروموزومها در زیر میکروسکوپ aceto-orcein، gentianviolet، acetocarmine و هماتوکسیلین برای رنگ آمیزی کروموزوم ها در زیر میکروسکوپ نوری به کارمی روند. مهمترین متد ها برای رنگ آمیزی کروموزومها در آزمایشگاه ها امروزه استفاده از Centromere (G-banding)، Giemsa، C-banding و (Reverse) R-banding (Quinacrine Q-banding) است.

پس از معرفی Q باند توسط Casperson و همکارانش در سال ۱۹۶۸ Pardueand Gall بصورت ناگهانی متوجه رنگ آمیزی افتراقی هتروکروماتین در مطالعات اولیه خود بر روی هیبریداسیون درجا شدند که مستقیماً منجر به معرفی C-banding گردید و در سال ۱۹۷۱ نیز G-banding و R-banding توسط چندین نویسنده کشف و گزارش شد.^{۲۴،۱۹} مناطقی که شدیداً رنگ آمیزی شده اند به نام باند مثبت و مناطقی که رنگ آمیزی ضعیف داشته اند به نام باند های منفی نام گذاری می شوند. G باند مثبت به نام G-band و به همین ترتیب برای R باند مثبت به نام R-band، مناطق C باند مثبت به نام C-band و مناطقی که حاوی مناطق سازنده

طی کشت سلولی بدست آورد. اضافه کردن مواد ویژه مانند کلسیمید به کشت های سلولی در مرحله رشد فعال برای دام انداختن و رویت سلولها در مرحله متافاز می تواند به این امر کمک کند. خیلی از انواع سلولها بطور همزمان تقسیم را شروع می کنند. اما در بعضی از موارد مانند لنفوسیت ها نیاز به تحریک کردن فعالیت میتوزی از طریق افزودن میتوژن ها در هنگام کشت سلولی دارند. موارد متنوعی از میتوژن ها برای استفاده در کشت لنفوسیت وجود دارند و تعداد سلول های یافت شده در مراحل متافاز با افزایش طول مدت قرار گرفتن میتوژن های ویژه افزایش خواهد داشت.^{۲۲،۲۱}

شایعترین میتوژن ها عبارتند از ماده فیتوهموگلوتینین (Phytohaemagglutinin=PHA) (گرفته شده از لوییای قرمز) که برای تحریک لنفوسیت های نوع T و ماده پاکوید (Pokeweed) که برای تحریک لنفوسیت های نوع B استفاده می شوند. با این فرآیند همزمان سلول ها در مرحله میتوز وارد می شود. این امر از طریق افزودن مواد شیمیایی که رسیدن سلول به مرحله فاز S را به مدت ۱۶ تا ۲۰ ساعت متوقف می کند میسر می گردد.^{۲۲}

افزودن تایمیدین اضافی یا آنتی متابولیتهای DNA amethopterin، بروم و داکسیلوریتین (Bromodeoxyuridine=Brdu) و فلوئورو اکسیلوریتین (fluorodeoxyuridine) برای همزمان کردن کشت سلولی موثر هستند. روش برداشت شامل سانتریفوژ کردن سلولها تحت تاثیر محلول کم نمک و فیکس کردن و گذاشتن سلولها بر روی اسلامیدهای شیشه ای است. هر یک از این فرآیندها در مرحله برداشت احتمالاً بر گستردگی کروموزوم بر روی اسلامید تاثیر می گذارند. زمان سپری شده در تهیه کردن گستردگی کروموزوم و تهیه اسلامیدهای مطلوب می تواند به مرحله تجزیه و تحلیل مطالعه کمک کند. تهیه گستردگی های قابل بررسی کروموزومی و متفرق کردن کروموزوم ها بر روی اسلامید میکروسکوپ بسیار حائز اهمیت می باشد. بیشترین میزان پخش شدن تحت تاثیر چندین متغیر در زمان برداشت سلولی است و گسترشی ایده آل است که همه ۴۶ کروموزوم جدا شده متافازی در زیر میکروسکوپ در یک فیلدی بدون همپوشانی کروموزومی قابل رویت باشند. استفاده از محلول های نمکی و استفاده از KCl رقیق شده یا محلول سدیم

نسبت به محو شدن بسیار مقاوم است و طول موج تحریک و انتشار طیف آن سازگار با مولکول های ریپورتر و فیلترهای متداول استفاده شده در روش FISH است^{۲۷,۱۵}. استفاده از رنگ های دیگر متعاقب کویناکرین مانند D ، distamycin A و actinomycin D ، ۷-آمینو اکتینومایسین D وجود دارد که الگویی مشابه R-band را نشان می دهند. پس از کویناکرین استفاده از رنگ آمیزی گیمسا متداول شده است که قبل از ریختن رنگ گیمسا از تریپسین استفاده می شود و دیگر رنگها همچون Wright و Leishman هم می توانند به جای گیمسا استفاده گردند که استفاده از آنها به طور کلی به نام G-banding نام دارد.

باندهایی که در Q-banding تیره هستند در روشن Q-banding می باشند و باندهایی که در Q-banding روشن هستند در G-banding تیره می باشند. روش رنگ آمیزی دیگر که الگوی باندهای ایجاد شده آن کاملاً متفاوت از دو روش ذکر شده قبل است به نام Reverse (R-banding) می باشد که از chromomycin استفاده می شود. همچنین mithramycin A3، olivomycin و acridine orange می باشند. همچنین استفاده از گرمای بالا و گیمسا و یا novobiocin می تواند الگوی R-banding ایجاد نماید که در این روش نواحی GC rich و نواحی کروماتینی فعال ثُنی و نواحی های ساختاری کوچک در قسمت هایی از زنوم که منجر به ناهنجاریهای فنوتیپی میگردد به خوبی مشخص می شوند.

برای نواحی تکراری و غیر کد کننده هتروکروماتین از روش C-banding استفاده می شود که در مقابل حرارت و مواد شیمیایی نواحی هتروکروماتین مقاوم هستند و این نواحی تیره می شوند و سایر نقاط روشن باقی می مانند. در این رنگ آمیزی از محلول های اسیدی و سپس بازی و رنگ گیمسا استفاده می شود. بازو های کوتاه و ستلاتیت های کروموزوم های اکروسانتریک، پری سانتریک، هتروکروماتین ها و بازوی بلند کروموزوم Y همه دارای ناحیه -C-band مثبت هستند که در افراد مختلف سایز متفاوت داشته و قادر فعالیت ثُنی هستند^{۲۰}. روش دیگری که برای بررسی نواحی تلومری و پری سانترومیریک کروموزوم ۹ با استفاده از G11-

هتروکروماتین است Q-band در نظر گرفته می شود. باندهای حاصل مبتنی بر عملکرد حاصل از همانندسازی است که NDA آنها در زمان های مختلف از مرحله S چرخه سلولی در حال همانند سازی است. به طور کلی می توان گفت AND ها در R-band زودتر از G-band همانند سازی می کند که متعلق به مناطق فشرده تر شده کروموزوم میتوزی می باشد^{۲۵,۲۶}.

شناسایی ناهنجاری های کروموزومی

مرسوم ترین روش بر مبنای رنگ آمیزی کروموزوم با یک رنگ و بررسی عملکرد کروموزومهای است. رنگ آمیزی در انواع سلول های تمایز یافته، سلولهای بینیادی و سلول های حاصل از مایع اطراف جنین قابل انجام است^{۳۰}. رنگ آمیزی در سال ۱۹۶۸ روی کروموزوم گیاه با استفاده از mustard quinacrine و در سال ۱۹۷۱ با استفاده از (Q-banding) quinacrine برای همه کروموزوم های انسان انجام شد. همچنین در مطالعات کاربردی سلولی همچون سلول درمانی و سلول های بینیادی مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا با این روش تمام ۲۴ کروموزوم انسان برای مطالعات کلینیکی به منظور بررسی کامل ناهنجاری های ساختاری و تعدادی کروموزومی قابل بررسی بودند اما در مناطق غنی از GC وضوح کافی وجود نداشت. Q-banding که شامل رنگ آمیزی با quinacrine است و به طور خاص به بازهای خاص واکنش نشان می دهد. این روش هرچند روش ساده ای بود اما برای رویت باندهای کروموزومی فلورسنت احتیاج به میکروسکوپ فلورسنت است که فلورسنت در مناطق غنی از AT روشن تر می باشد^{۲۶,۲۷}. علاوه بر quinacrine رنگ های فلورکروم دیگری برای نواحی غنی از AT شامل 33258 (diimidazolionphenylindole) DIPI hoechst -phenylindole) استفاده می شود که daunomycin 4',6'-diamidino-2 DAPI و استفاده از آنها به طور کلی به نام Q-banding نام دارد. استفاده از آنها به طور کلی به نام Hoechst و DAPI در گوائین خاموش نمی شود و بنابراین باندهای تولید شده توسط آنها نسبت به باندهای تولید شده توسط Quinacrien مبهم نیست. با این حال، فلورسنس daunomycin تا حد زیادی در DNA با محتوای GC بیش از ۳۲٪ می باشد. رنگ آمیزی DAPI دارای این مزیت است که

به سکانس مورد هدف کروموزوم انسان هیبریدمی شود. لیل های مورد استفاده فلورسنت هستند از اینرو به نام تکنیک *Fluorescence in situ hybridization (FISH)* نام گذاری شده است. سایر لیل های دقیق برای همین هدف به کارمی روند. رنگهای فلوروکروم مختلفی برای چندین پروب با یک رنگ و دو فیلتر با کمک light UV تواند مورد استفاده قرار گیرد. نواحی تکراری اختصاصی در α -Satellite با پروب FISH در سلولهای ایترفالز و متافازی با سیگنال های درخشنان کاملا مشخص هستند. مزیت این روش استفاده از سلولهای غیر تقسیم شونده، حذف زمان کشت برای تقسیم میتوzی، بررسی ریز حذف ها/ مضاعف های کلینیکی که در روش سیتوژنتیک معمولی تشخیص آنها مشکل می باشد و بررسی هر کروماتید از دو کروموزوم همولوگ از طریق سیگنال های آزاد شونده از پروب ها میسر می گردد. پروب هایی برای تشخیص نوپلазی و لوکمی و انواع تغییرات کروموزومی در سرطانها طراحی شده اند که برای تشخیص و درمان زودرس موثر باشند.^{۳۰}. امروزه کتابخانه ای از پروب های مختلف برای تمام یا قسمتی از کروموزوم برای شناسایی مارکرهای کروموزومی، منشا کروموزومی و تغییرات ساختاری کروموزومی طراحی شده است. مت دیگری که بررسی همزمان ۲۴ کروموزوم انسانی با پروب رنگی را فراهم می کند روش *Multicolor FISH* است که برای بررسی ناهنجاریهای های پیچیده و مقایسه ژنومی انسان با سایر موجودات کاربرد دارد.^{۳۱، ۳۲}.

لزوم استفاده از بررسی های کروموزومی در تشخیص و درمان بیماریها

بررسی های بندینگ کروموزومی برای شناسایی اختلالات تعدادی کروموزوم، جایه جایی ناحیه ای از یک کروموزوم به کروموزوم دیگر، حذف، معکوس و یا مضاعف شدن بخشی از کروموزوم کاربرد دارند. این روشها تاکنون تاثیر ارزشمند در ژنتیک پژوهشی داشته و با پیشرفت‌های این روشها به قدرت استفاده از آنها نیز افزوده شده است. سندرم های با حذف و مضاعف سازی های میکروسکوپی که با روش های معمول به سختی قابل تشخیص هستند^{۳۳} بصورت ساده ای در اکثر موارد توسط روش های پیشرفتی

banding و بازوی کوتاه کروموزوم ۱۵ با استفاده از distamycin و یا DAPI banding و مناطق سازماندهی فعال هسته ای (active NOR) Silver staining با استفاده از nucleolar organizing regions=NOR است که نواحی غیرعادی ژنومی را در سیتوژنتیک مشخص مینماید.

استفاده از روشهای پیشرفته تر

علاوه بر روش های استاندارد بندینگ، تکنیک دیگری که مورد توجه قرار گرفته است و آنالیز دقیقت و بیشتر از باندهای کروموزوم را مورد توجه قرار می دهد تکنیک High resolution است که به چند طریق انجام می شود. در ابتدا سلولها در late prophase یا در early metaphase که حداقل تراکم و حداقل رزولوشن را دارند فیکس و ثابت می شوند. همزمان سازی سلولها و در مدت زمان کوتاه در معرض کلسید قرار گرفتن آنها سبب رزولوشن بیشتر و ریز باندهای بیشتری مشخص خواهد شد. همچنین اضافه کردن موادی که متصل به مولکول NAD می شوند و از متراکم شدن acridine Orange , Ethidium bromide و actinomycin D به این روش کمک می کند. روش دیگر استفاده از آنالوگ بازهای DNA مانند Brdu است هر دو الگوی G and R مشخص می گردند و این تکنیک برای بررسی دقیق بازارانی های کروموزومی بسیار حساس بوده و در بسیاری از بررسیهای کلینیکی این روش مورد استفاده قرار می گیرد.^{۳۴، ۳۵} کاریوتایپ با وضوح بالا High-resolution (حدود ۲۰۰۰-۲۵۰۰ باند) نیز برای کروموزومهای انسان در اواسط مرحله پرمتفاژ سلولی مورد استفاده قرار میگیرند. باندها ممکن است به قسمت های کوچکتری تقسیم شده باشد و این قسمت های کوچکتر بصورت اعشار پس از باند قرار میگیرد. رزولوشن کروموزومی با ۲۰۰۰ باند کروموزوم ممکن است حاوی ۱/۵ Mb از DNA در حالی که رزولوشن ۳۰۰ باند شامل DNA Mb^{۱۰-۷} است. افراد ماهر ممکن است قادر به تشخیص ۱۰-۵ Mb حذف DNA در آن محل باشند، اما در سطح مولکولی ژنوم انسان احتمالا شامل بیش از ۲۰۰۰ باند قابل تشخیص است^{۳۶}. مت دیگری مولکولی نیز روش پیشرفته تر دیگری است که طی آن پروب لیل شده DNA برای توالی های ویژه که در همان محل

پیدا شده است. در کروموزوم موش، قسمت اصلی هتروکروماتین قابل مشاهده به صورت نزدیک به سانترومر هر کروموزوم یافت می شود و مقدار هتروکروماتین در این قسمت ها نیز بین گونه های مختلف موش متفاوت است. در مناطق هتروکروماتین منع فعالیت نوترکیبی، نسخه برداری و تاخیر در همانندسازی دیده می شود.^{۳۳}. مناطق جزایر CpG و یا منطقه ژنی فعال در هتروکروماتین - مناطق Cbanding در ژنوم موش و انسان یافت نشده است و اغلب مناطق هتروکروماتین خاموش می باشند. هتروکروماتین ها ساختار کروماتینی مشخصی دارند که در کروموزوم موش و انسان متیله هستند و تراکم پروتئین MECP2^{5M}CpG-binding protein در این مناطق بسیار زیاد است و سطح هیستون استیله در آن بسیار کم است و در پستانداران سلول های بنیادی جنبینی قبل از تمایز هیستون H4 در هتروکروماتین استیله است.^{۳۴}. مجموعه ای از پروتئین های کروموزومی (multi protein) موتیف هایی دارند که در تشکیل هتروکروماتین نقش دارند. بسیاری از این پروتئین ها مانند chromo box از مهمترین پروتئین ها در شکل گیری کمپلکس هتروکروماتین می باشند.^{۲۹}. بررسی پایگاه داده های ژنوم نشان می دهد که جزایر CpG به صورت خوش ای بیشترین تراکم ژنی را دارند. از این رو بیشترین تراکم ژن ها در ژنوم انسانی در R-, T-, Tbanning واقع اند. این وضعیت مشخص می کند که چرا کروموزوم های انسان با محتوای بالای G-band (به عنوان مثال تریزو می های ۱۸، ۱۳ و ۲۱) دیده می شود در حالی که تریزو می برای کروموزوم کوچک و غنی از T-, R-band (به عنوان مثال در کروموزوم ۲۲) در مراحل اولیه جنبینی از بین می روند.^{۳۵}.

همچنین در تعیین توالی کل ژنوم انسانی (Whole genome sequencing) تراکم ژن های کمتر در کروموزوم انسانی ۲۱ نسبت به کروموزوم ۲۲ تایید شده است. در سطح باندهای کروموزوم مناطق حفاظت شده از کروموزوم وجود دارد که از نظر نسبت تراکم ژن، زمان تکثیر DNA و ویژگی های باندها، تکامل کروموزوم پستانداران را بیش از ۱۰۰ میلیون سال نشان می دهد. این مسئله نفوذ یک فشار انتخابی قوی برای حفظ ویژگی های کروموزوم، تراکم ژن، زمان همانند سازی و نوع باندها را در طول زمان نشان می دهد.^{۳۶،۳۷}.

تر قابل تشخیص هستند. در این روش پروب هایی برای شمارش کروموزوم های جداگانه طراحی شده که در سیگنال های جداگانه برای هر یک از کروماتید ها قابل تشخیص بوده و زمان کشت مورد نیاز برای آمادگی را کم می کند و کروموزوم های گسترش یافته ای را ایجاد می کنند که بصورت قابل اطمینان می توان شمارش و ارزیابی ها را انجام داد. پروب ها فقط یک سیگنال روی کروموزوم مورد نظر برای بررسی سریع برای سایر گونه ها و برای اجرای نقشه ژنوم مقایسه ای ایجاد می کنند. این روش ها برای بررسی آنومالی های کروموزومی وسیله ای مفید برای انسان ارائه می کند که تعداد کروموزوم و توالی خاص DNA و همچنین از سلولهای غیر قابل تقسیم بررسی ها انجام می شود.^{۳۳}. تشخیص حذف های کروموزومی در ارتباط با اختلالات ژنی ارائه کننده برخی از موقعیت های ژن بیماری برای اولین بار در انسان است. به طور مشابه، جایه جایی ها در مشخص کردن محل ژن بیماری و ارتباط آن با برخی از Leukaemia مهم است. این روشها برای تشخیص و پیش آگهی اساس مولکولی سرطان ها مهم است. یکی از بهترین نمونه ها برای جایه جایی ها میتوان به جایه جایی بین کروموزوم های ۹ و ۲۲ انسانی (9q:34q)(11q:22t) و یا کروموزوم فیلادلفیا برای تشخیصی لوسومی میلؤیدی مزمن (CML) اشاره نمود.^{۳۸}.


همیت استفاده از بررسی های کروموزومی در روابط تکاملی

مقایسه الگوهای کروموزومی، روابط تکاملی بین گونه ها و همچنین تغییرات تدریجی در آنها را نشان می دهد. الگوهای باندهای حاصل از انسان، گوریل و کروموزوم شامپانزه تقریباً یکسان است، هر چند کروموزوم ۲ انسانی نتیجه تلفیقی بین دو کروموزوم بزرگ میمون است. شباهت گسترده بین کروموزوم انسانی و پستانداران وجود دارد.^{۳۹}.

در انسان، بیشترین C-banding در بازوی بلند کروموزوم Y و نزدیک به سانترومر کروموزوم های ۹، ۱۶ وجود دارد. اندازه این C-banding بین افراد متفاوت است. کوچکترین C-banding در ناحیه سانترومی در بازوی P در پنج کروموزوم ۲۲ و ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۱ در پنج کروموزوم

بسیاری از کروموزوم خزنده ها دارای G-band و تا حدی R-band می باشند. دوزیستان، ماهی ها و گیاهان گونه هایی هستند که این مورد در آنها یافت نمی شود. پایینترین مهره داران که G-banding خوبی در مورد آنها گزارش شده ماهی استخوانی هستند.^{۳۷} امروزه انواع سلول ها و اجزای سلولی در درمان بسیاری از بیماری های قلبی، سرطانها و ناهنجاری های دارای اهمیت بسیاری در پزشکی فرد محور است.^{۳۸}

هتروکروماتین ها در نواحی C-band پایین ترین نرخ نوتრکیبی را نشان می دهد. در R-banding مناطق سیناپسی و کراسینگ اور در پستانداران و دیگر مهره داران مشخص می شود. در حالی که الگوهای G.Q-banding و R که تنها در برخی یوکاریوت مشاهده شده، اما باندهای نواحی همانندسازی تقریبا در میان همه موجودات زنده با در اختیار داشتن نمونه کروموزوم به اندازه کافی با استفاده از میکروسکوپ قابل بررسی است. کروموزوم پستانداران و پرندگان می تواند از نوع G-band و R-band باشد. علاوه بر این،



شکل ۱: فرایند سلول درمانی و بررسی کروموزومی

نماید. چندین مطالعه تعدادی از ناهنجاری های کروموزومی را در بین نمونه های اهدایی و طی کشت سلولی گزارش کرده اند و جهت استفاده های درمانی نیازمند تاییدیه سلامت محصول از جهت محتوای ژنتیکی می باشد. استفاده از مواد شیمیایی مناسب و دستگاه های پیشرفته در حال گسترش هستند تا برای بررسی دقیق تر کروموزومی و مقایسه سریع ژنوم انسان و سایر گونه ها کمک نمایند. استفاده از مواد جدید و همگام با آن روش های کامپیوتری و مولکولی تحقیق و ارزیابی کروموزومها را در انواع گونه ها و مقایسه با ژنوم انسانی را برای اهداف مختلف سلول درمانی آسان تر

نتیجه گیری

توسعه و گسترش انواع سلول ها در درمان بسیاری از بیماری های دارای اهمیت بسیاری در پزشکی شخصی است و بررسی دقیق کروموزومی ها و جلوگیری از اختلالات بعدی در طول چند دهه گذشته قابل توجه بوده است. نگهداری طولانی مدت از سلول ها و تزریق مکرر آنها به افراد ایجاب میکند که از نظر تعداد و ساختار کروموزوم ها در سلول های هدف دائم ارزیابی شوند و از طرفی کشت طولانی مدت این سلول ها در اثر فعل شدن برخی ژنها می تواند آنها را به سمت تومورزاگی و تغییرات سلولی هدایت

درمانی در پزشکی شخصی مورد توجه قرار گرفته است. آشنایی با این روش و انواع آن و بررسی های دوره ای و منظم از پایداری ژنومی در سلولها قبل از کاربردهای کلینیکی آنها ضروری است.

می نماید. در این بین تکنیکهای مختلفی امکان بررسی کروموزومها را فراهم آورده است تا سلامت سلولها از نظر محتوای کروموزومها بطور اختصاصی کنترل و بررسی شوند. استفاده از این تکنیکها هم در تشخیص بیماری های انسانی و هم در زمینه مطالعات سلول

References

- Mansouri F. A Review of Stem Cell Technology. Alborz University Medical Journal. 2018;7(3):181-9.
- Miryounesi M, Nayernia K, Dianatpour M, Mansouri F, Modarressi MH. Co-culture of Mouse Embryonic Stem Cells with Sertoli Cells Promote in vitro Generation of Germ Cells. *Iran J Basic Med Sci.* 2013;16(6):779-83.
- Golchin A, Farahany TZ. Biological Products: Cellular Therapy and FDA Approved Products. *Stem Cell Reviews and Reports.* 2019;15(2):166-75.
- Golchin A, Farahany TZ, Khojasteh A, Soleimanifar F, Ardeshirylajimi A. The Clinical Trials of Mesenchymal Stem Cell Therapy in Skin Diseases: An Update and Concise Review. *Current Stem Cell Research & Therapy* 2019;14(1):22-33.
- Wang Y, Zhang Z, Chi Y, Zhang Q, Xu F, Yang Z, et al. Long-term cultured mesenchymal stem cells frequently develop genomic mutations but do not undergo malignant transformation. *Cell Death & Disease* 2013;4(12):e950-e.
- Rebuzzini P, Zuccotti M, Redi CA, Garagna S. Chromosomal Abnormalities in Embryonic and Somatic Stem Cells. *Cytogenetic and Genome Research* 2015;147(1):1-9.
- Cornélio DA, Medeiros SRBd. Genetic evaluation of mesenchymal stem cells. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia* 2014;36:238-40.
- Wan TS, Hui EK, Ng MH. Chromosome Recognition. *Methods Mol Biol.* 2017;1541:67-74.
- Barbaric I, Biga V, Gokhale PJ, Jones M, Stavish D, Glen A, et al. Time-lapse analysis of human embryonic stem cells reveals multiple bottlenecks restricting colony formation and their relief upon culture adaptation. *Stem cell reports* 2014;3(1):142-55.
- Avery S, Hirst AJ, Baker D, Lim CY, Alagaratnam S, Skotheim RI, et al. BCL-XL mediates the strong selective advantage of a 20q11. 21 amplification commonly found in human embryonic stem cell cultures. *Stem cell reports* 2013;1(5):379-86.
- Baker D, Hirst Adam J, Gokhale Paul J, Juarez Miguel A, Williams S, Wheeler M, et al. Detecting Genetic Mosaicism in Cultures of Human Pluripotent Stem Cells. *Stem Cell Reports* 2016;7(5):998-1012.
- Borgonovo T, Vaz IM, Senegaglia AC, Rebelatto CLK, Brofman PRS. Genetic evaluation of mesenchymal stem cells by G-banded karyotyping in a Cell Technology Center. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia* 2014;36:202-7.
- Mansouri F. Non-invasive Prenatal Testing: New Prospects to Personalized Prenatal Medicine. *Alborz University Medical Journal* 2019;8(1):1-10.
- Amps K, Andrews PW, Anyfantis G, Armstrong L, Avery S, Baharvand H, et al. Screening ethnically diverse human embryonic stem cells identifies a chromosome 20 minimal amplicon conferring growth advantage. *Nature Biotechnology* 2011;29(12):1132-44.
- Rao PH, Nandula SV, Murty VV. Molecular cytogenetic applications in analysis of the cancer genome. *Methods Mol Biol.* 2007;383:165-85.
- Tarte K, Gaillard J, Lataillade J-J, Fouillard L, Becker M, Mossafa H, et al. Clinical-grade production of human mesenchymal stromal cells: occurrence of aneuploidy without transformation. *Blood, The Journal of the American Society of Hematology* 2010;115(8):1549-53.
- Capelli C, Pedrini O, Cassina G, Spinelli O, Salmoiraghi S, Golay J, et al. Frequent occurrence of non-malignant genetic alterations in clinical grade mesenchymal stromal cells expanded for cell therapy protocols. *Haematologica* 2014;99(6):e94-7.
- Stultz BG, McGinnis K, Thompson EE, Lo Surdo JL, Bauer SR, Hursh DA. Chromosomal stability of mesenchymal stromal cells during in vitro culture. *Cytotherapy* 2016;18(3):336-43.
- Sumner A. The nature and mechanisms of chromosome banding. *Cancer genetics and cytogenetics* 1982;6(1):59-87.
- Chen CP, Su YN, Chern SR, Chen YT, Wu PS, Su JW, et al. Mosaic trisomy 2 at amniocentesis: prenatal diagnosis and molecular genetic analysis. *Taiwan J Obstet Gynecol.* 2012;51(4):603-11.
- Charleen M Moore RGB. Chromosome Preparation and Banding. *ENCYCLOPEDIA OF LIFE*

- SCIENCES 2001:1-7.
22. Holmquist GP. Chromosome bands, their chromatin flavors, and their functional features. *Am J Hum Genet.* 1992;51(1):17-37.
 23. Bickmore W. Karyotype analysis and chromosome banding. *Encyclopedia of Life Sciences*, Vol. 10. John Wiley & Sons: Chichester, UK; 2005.
 24. Sumner AT. Chromosome banding and identification absorption staining. *Chromosome Analysis Protocols*: Springer; 1994. p. 59-81.
 25. Bakhoum SF, Silkworth WT, Nardi IK, Nicholson JM, Compton DA, Cimini D. The mitotic origin of chromosomal instability. *Current Biology* 2014;24(4):R148-R9.
 26. Jacobs K, Zambelli F, Mertzanidou A, Smolders I, Geens M, Nguyen HT, et al. Higher-density culture in human embryonic stem cells results in DNA damage and genome instability. *Stem Cell Reports* 2016;6(3):330-41.
 27. SC R. Fluorescence in situ hybridization: molecular probes for diagnosis of pediatric neoplastic diseases. *Cancer investigation* 2000.
 28. Das K, Tan P. Molecular Cytogenetic Analysis: Applications in Cancer. eLS. 2001.
 29. Bickmore WA. Karyotype Analysis and Chromosome Banding. *ENCYCLOPEDIA OF LIFE SCIENCES* 2001:1-7.
 30. Savad S, Mehdipour P, Miryounesi M, Shirkoohi R, Fereidooni F, Mansouri F, et al. Expression analysis of MiR-21, MiR-205, and MiR-342 in breast cancer in Iran. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2012;13(3):873-7.
 31. Guenther MG, Frampton GM, Soldner F, Hockemeyer D, Mitalipova M, Jaenisch R, et al. Chromatin Structure and Gene Expression Programs of Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells. *Cell Stem Cell* 2010;7(2):249-57.
 32. Mansouri F. The role of the clinical and molecular assays in pro state cancer detection. *Asian J Pharm Clin Res.* 2017;10(6):11-5.
 33. Xiao H, Yang Y, Zhang C, Liao E, Zhao H, Liao S. Karyotype analysis with amniotic fluid in 12365 pregnant women with indications for genetic amniocentesis and strategies of prenatal diagnosis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology* 2016;36(3):293-6.
 34. Jeppesen P, Turner BM. The inactive X chromosome in female mammals is distinguished by a lack of histone H4 acetylation, a cytogenetic marker for gene expression. *Cell* 1993;74(2):281-9.
 35. Dunham I, Shimizu N, Roe BA, Chissoe S, Hunt AR, Collins JE, et al. The DNA sequence of human chromosome 22. *Nature* 1999;402(6761):489-95.
 36. Jeppesen P. Histone acetylation: a possible mechanism for the inheritance of cell memory at mitosis. *Bioessays* 1997;19(1):67-74.
 37. Mansouri F. Use of stem cell-derived exosomes as a therapeutic approach in cardiovascular disease in personalized medicine. *Alborz University Medical Journal* 2021;10(3):90-96.

Fatemeh Mansouri^{1,2*} Ali Golchin³

¹ Department of Genetics and Immunology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

² Cellular and Molecular Research Center, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

³ Department of Applied Cell Sciences and Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Importance of Chromosomal Studies in Cell Therapy and Its Applications

Received: 8 Jun 2020 ; Accepted: 6 Sept 2020

Abstract

Currently, the use of cell therapy is an effective treatment method in some types of diseases. The use of stem cells and somatic cells, due to the complete genetic similarity with individual cells, has led to the development of cell therapy methods. In recent years, significant advances have been made in the methods of culturing, isolating, and long-term cell maintenance. However, there are still problems and concerns related to their clinical use, the resolution of which requires more detailed studies in this area. One of these problems is genomic changes in cells that can affect the potential for differentiation of stem cells. Genetic abnormalities occur during successive cultures during the process of proliferation and differentiation, and can affect cell behavior and subsequent laboratory results. The aim of this study is to investigate the importance of chromosomal studies in cell therapy for the analysis of chromosomes and summarize the applications and limitations of these methods in the medical sciences.

Conclusion: The results of this discussion show that the use of different techniques of chromosomal studies can be considered in the final evaluation and obtaining confirmation of the accuracy of cellular products in treatment. Periodic and regular examinations of genomic stability in cells before their clinical use are essential.

Keywords: Stem cells, Chromosome, Cell therapy, Genetic abnormalities

***Corresponding Author:**

Department of Genetics and Immunology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Tell: 09123704153
E-mail: ansouri1600@hotmail.com